



Erdeven, le 30 avril 2019

## Les gravelots à collier interrompu sont de retour.

D'avril à la mi-août, il est possible d'observer sur nos plages le Gravelot à collier interrompu, un oiseau de petite taille de la famille des limicoles. Il a la particularité de nicher et donc de pondre ses œufs sur les hauts de plage à proximité de la laisse de mer où les poussins pourront se nourrir.

### Une population en déclin

Le Gravelot à collier interrompu est un oiseau rare en France et en déclin au niveau européen. La Bretagne héberge une part importante de la population nicheuse nationale avec 240 couples recensés en 2018 sur 20 sites différents. Avec 70 couples observés l'an dernier, les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon constituent le principal site de la région. L'enjeu est donc fort pour préserver cette espèce emblématique de notre littoral, témoin de la valeur patrimoniale des milieux qu'elle occupe.

Aujourd'hui le succès reproducteur de cet oiseau protégé est faible. Pour 2 couples, seulement 1 poussin parviendra à s'envoler (0,5 jeune par couple), alors que les scientifiques estiment que pour assurer la viabilité de l'espèce il faudrait que ce chiffre soit de 0,8 jeune à l'envol par couple.

### Les gardes du littoral au chevet de l'espèce

Le syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon mène des actions de suivi de cette espèce dans le cadre du Plan Régional d'Actions coordonné par l'association Bretagne Vivante. Les gardes du littoral assurent la protection des sites de reproduction et d'habitat. Ainsi, ils repèrent les nids, les matérialisent par des enclos puis ils suivent les nichées et participent aux recensements des couples et des jeunes avec le soutien de bénévoles de Bretagne Vivante. Ils sensibilisent également les promeneurs à la présence de l'espèce.

### Des gestes simples pour contribuer à sa préservation

Durant sa période de nidification le gravelot à collier interrompu est très vulnérable. Il peut être victime d'aléas naturels comme les grands coefficients de marées qui peuvent emporter des nids ou la présence de prédateurs naturels, certains comportements humains le mettent également en danger.

Pendant sa période de nidification, le gravelot à collier interrompu est très sensible au dérangement. Ces dérangements constituent la principale de ces perturbations d'origine humaine, les oiseaux adultes sont alors contraints de quitter le nid, augmentant ainsi les risques pour les œufs (prédation, échec de la couvaison). Il convient de les observer à distance avec des jumelles.

En marchant en haut de plages, les promeneurs risquent d'écraser par mégarde les œufs. A cette période de l'année, il est donc préférable de marcher en bas de plage et surtout de respecter les zones de protection.

### Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon

Parc de Keravéon 56410 ERDEVEN  
02 97 55 50 89 - [accueil@gavres-quiberon.fr](mailto:accueil@gavres-quiberon.fr)  
[www.gavres-quiberon.fr](http://www.gavres-quiberon.fr)

Les chiens en liberté peuvent faire fuir les oiseaux et causer des échecs de couvaison et engendrer une surmortalité des poussins qui ne volent pas encore. Il est donc important de tenir en laisse son animal de compagnie.

Sans ces gestes simples, les chances de survie de l'espèce sur nos plages sont très faibles et les actions menées par le Grand Site de France seront vaines.



Crédit photo : © Yaouenn SABOT